

PROTOKOLL S.

ALS EMPFINDLICH, MIT SEHR KLEINER DOSIERUNG DURCH KLEINE

Das S-Protokoll oder Sensitive-Protokoll ist für Personen gedacht, die CDS nicht auf die gleiche Weise wie die meisten anderen einnehmen können.

CDS wird verwendet, weil es erträglicher ist und weniger Nebenwirkungen hat.

Hierzu wird 1 ml CDS für 500 ml Wasser verwendet, das am ersten Tag verteilt wird. Am zweiten Tag werden 2 ml CDS in 1 l Wasser verwendet. Wenn es keine Rückschläge gibt (und normalerweise auch nicht), kann die Dosis von hier aus jeden Tag auf 1 ml mehr pro Liter erhöht werden, bis 10 ml CDS pro Liter Wasser erreicht sind.

Dies sind die wichtigsten Protokolle. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Bücher** oder im Forum www.saludprohibida.com

Warnung

Merken Sie sich; Die Ergebnisse sind nur Bewertungen der experimentellen Forschung an Freiwilligen. Sie stellen keine medizinische Beratung oder Verschreibung dar. Wir postulieren keine Empfehlung an irgendjemanden... für eine bestimmte Bedingung oder Krankheit.